

TRAUMA

Traumapatient med hjärtstopp / hotande hjärtstopp

1

Traumatisk orsak till hjärtstoppet?

Nej

A-HLR handlingsplan

Ja

2

Starta A-HLR

Åtgärda omedelbart reversibla orsaker, arbeta simultant

Hypoxi
Hypovolemi
Tamponad
Tryckpneumothorax

1. Hypovolemi/blödning - Stoppa yttre blödning
2. Hypoxemi - Säkra luftvägen och maximera oxygenering
3. Tryckpneumothorax - Bilateral thoraxdekompression
4. Tamponad - Torakotomi
5. Adekvat infusion och transfusionsbehandling

Torakotomi eller annan livräddande kirurgisk åtgärd

Omedelbar transport till närmaste akutsjukhus med kirurgisk kompetens enligt lokal riktlinje

Återkomst av spontan cirkulation ROSC?

Ja

Nej

Fortsatt omhändertagande/kirurgisk behandling

Överväg avbrytande av HLR

BLÖDNING STOPPAS MED:

- externt tryck
- tourniquet
- hemostatiskt förband
- bäckengördel
- aortakompression

- Sätt grova infarter alt. intraosseös nål.
- Ge i.v. vätska eller blodprodukter enligt lokal riktlinje.
- Ge tranexamsyra 100 mg/ml i.v./i.o 1 ml/min.
Vuxna ≥ 14 år 1 g barn 15-20 mg/kg max 1 g