

Neonatal resuscitering

Alla nyfödda barn

- Bedöm andning och muskeltonus

Apné eller otillräcklig andning

Skapa fri luftväg

- Stimulera
- Torka torrt
- Förebygg hypotermi

Apné eller otillräcklig andning

Ventilera

- 60 andetag/min

Anslut EKG och pulsoximeter

Bedöm ventilationen

- Höjer sig bröstkorgen?
- Hörs andningsljud?
- Ökar hjärtfrekvensen?

Säkerställ effektiv ventilation

Bedöm ventilationen

- Höjer sig bröstkorgen?
- Hörs andningsljud?
- Ökar hjärtfrekvensen?

Hjärtfrekvens < 60, ökar inte trots
60 sek ventilation med säkrad luftväg
(endotrakealtub / larynxmask)

Fortsätt ventiler

- Ge bröstkompressioner i förhållandet 3:1
- Förbered kärlaccess

Omvärdera ventilation och hjärtfrekvens
var 30:e sekund

Fortsätt ventiler

- Fortsätt bröstkompressioner i förhållandet 3:1

Överväg läkemedel

60 sek

- TILLKALLA HJÄLP
- Tydligt LEDARSKAP
- Tydlig KOMMUNIKATION
- OMVÄRDERA REGELBUNDET

Ge extra syrgas om SpO₂ är:

- 3 min < 70%
- 5 min < 85%
- 10 min < 90%

Om SpO₂ > 95 %, minska O₂



Bröstkorgen
höjer sig inte

- Justera masken
- Justera huvudläget
- Avlägsna luftvägshinder
- Överväg sugning



Hjärtfrekvensen
ökar

Fortsätt ventiler



Hjärtfrekvensen
ökar inte

Larynxmask Intubation

Tubstorlek och införsdjsjup

Barnets vikt	< 1 kg	1-2 kg	2-3 kg	> 3 kg
Tubstorlek	2.0-2.5	2.5-3.0	3.0-3.5	3.5-4.0
Införsdjsjup (vid mungipan)	6-7 cm	7-8 cm	8-9 cm	9-10 cm