

Bakteriers känslighet för olika antibiotika (Del 2/2)

	Grampositiva aerob								Grampositiva anaerob	Gramnegativa aerob												G-nuancer				
	S. aureus	Attiemolytiska streptokocker	Beta-hemolytiska streptokocker (A, C, G)	Pneumokocker	E. faecalis	E. faecium	S. saprophyticus	Listeria	C. perfringens	C. difficile	Meningokocker	H. influenzae	Moraxella	E. coli	Klebsiella	Enterobacter	Proteus	Shigella, Salmonella	Campylobacter	Pseudomonas	Legionella	F. tularensis	Pasteurella	B. fragilis	Mycoplasma, Chlamydia	Borrelia
Erytromycin (oralt/IV)																										
Azitromycin (oralt/IV)																										
Klindamycin (oralt/IV)																										
Doxycyklin (oralt)																										
Metronidazol (oralt/IV)																										
Ciprofloxacin (oralt/IV)																										
Moxifloxacin (oralt/IV)																										
Trimetoprim (oralt)																										
Trimetoprim/sulfonamid (oralt/IV)																										
Nitrofurantoin (oralt)																										
Amikacin, gentamicin, tobramycin (IV)																										
Vankomycin (oralt/IV) ⁵																										

1: hög dos; 2: cirka 15-20 % resistent; 3: endast nedre urinvägsinfektion; 4: inducerbar resistens; grå linje: osäker aktivitet; 5: oral behandling endast vid Clostridium difficile-enterit.