

Spinalanestesi: rekommenderad dos (mL)

Ingrepp	Marcaïn Heavy (5 mg/mL)	Marcaïn Spinal (5 mg/mL)	Fentanyl (50 µg/mL)	Morfin Special (0.4 mg/mL)	Övrigt
Gynekologi / obstetrik					
Kejsarsnitt	2.0-2.4		0.1	0.25	
Suturering av förlossnings-skador	1.0				
Manuell placentalösning	1.2		0.2		
Spinalanestesi vid förlossning (om förlossning väntas inom < 3 h)		0.5			Sufenta (5 µg/mL) 1 mL
Prolapskirurgi	1.8-2.5		0.2		
Epidural påfyllnad vid kejsarsnitt / analsfinkterruptur			1 (epidural)		Ropivakain (7.5 mg/mL) 10-20 mL (epidural)
Vaginal hysterektomi (utan generell anestesi)	2.6-2.8		0.2	0.5	
Abdominell hysterektomi (med generell anestesi)	2-2.5		0.2	0.5	
Ortopedi					
Höftfraktur		1.6-2.2	0.2-0.4		
Höftprotes (överbäg CSE)		1.6-2.4	0.2-0.4		Klonidin (150 µg/mL) 0.2-0.4 mL om ej CSE
Unikompartmentell knäprotes		1.6-2.4			
Total knäprotes / revision (överbäg CSE)		1.6-2.4	0.2-0.4		Klonidin (150 µg/mL) 0.2-0.4 mL om ej CSE
Mindre ingrepp på underben, fotled eller fot	1.8-2.4	eller 1.8-2.4	överbäg 0.2-0.4		
Benamputation (CSE föredras)		1.6-2.2	0.4	0.25 om ej CSE	
Knäartroskopi	1.8-2.5	eller 1.8-2.5			
Urologi / kirurgi					
TUR-B/P, TURIS-P, cystoskopi med biopsi, TUIP, intern uretrotomi	1.8-2.5				
Lågdos-TUR-B i dagkirurgi (1 timmes blockad)	1				Sufenta (5 µg/mL) 1 mL
Ureteroskopi / litotripsi	2.5-3.0		överbäg 0.2		
Laparoskopisk / robotassisterad kolonkirurgi; rektumamputation		1		0.5	
Kärlkirurgi i lumsken (operationstid < 3 h)		2.8			
Perifer kärlbypass		3-3.2	överbäg 0.2		Klonidin (150 µg/mL) 0.3 mL
Ljumsckbräck		2.6-3			